

Cómo detectar fentanilo en sus drogas

con las tiras reactivas
BTNX Rapid Response™

Las tiras reactivas son una herramienta útil, pero no perfecta. Los resultados pueden variar según la sustancia que se analice y el método utilizado. Es decir que los resultados no siempre serán precisos o confiables.

Estas instrucciones ofrecen una guía rápida de cómo usar las tiras reactivas BTNX Rapid Response™. Están diseñadas para mostrarle los pasos principales. Para instrucciones completas y detalladas, visite las indicaciones oficiales del fabricante aquí: btnx.com/category/harm-reduction



Salvando Vidas
OREGON

SalvandoVidasOregon.org

1 Prepare la droga


Polvo, cristal, pastillas

Triture y mezcle. Mida 10 mg de polvo en una bolsita o recipiente pequeño como un taparrosca.

10 mg ≈ tamaño de un grano de arroz o una micro cuchara

Inyección

Prepare la inyección en un calentador limpio. Cuando ya tenga la mezcla en la jeringa, analice el residuo que quedó en el calentador.



2 Agregue agua

Polvo, cristal, pastillas

Agregue como 5 ml/cc de agua limpia a una bolsita, recipiente o calentador. Mezcle bien.

5 ml/cc de agua ≈ 1 taparrosca o cucharadita

Inyección


Agregue como 1 ml de agua limpia al residuo en el calentador usado.



3 Sumerja la tira 15 segundos

Sujete la tira por el extremo de color. Sumerja el otro extremo en la mezcla por 15 segundos.

No pase las líneas onduladas.



4 Espere 2-5 minutos

Ponga la tira reactiva en una superficie plana. Espere 2-5 minutos para ver el resultado.

Si lee los resultados después de 10 minutos, podrían estar incorrectos.



5 Lea el resultado



1 línea roja = POSITIVO

Podría contener fentanilo.

Nota: Un resultado positivo no indica la cantidad de fentanilo.



2 líneas rojas = NEGATIVO

Fíjese bien, ¡la segunda línea puede verse borrosa!

Nota: Un resultado negativo no significa necesariamente que la muestra o todo el suministro esté libre de fentanilo.

Si solo hay una línea roja a la izquierda o ninguna línea, la prueba es inválida. Repita con una nueva tira.

Precaución

Las tiras reactivas no son perfectas. No indican la potencia de una sustancia, qué más podría contener o si es segura.

Pasos para reducir su riesgo

Aún si el resultado de la prueba es negativo, todavía hay peligro de sobredosis. Tome los pasos necesarios para reducir su riesgo.

- **Analice sus drogas.**
- **Lleve naloxona.**
- **Pida ayuda si usa drogas solo.**



¿Qué es fentanilo?

Fentanilo es un fuerte opioide sintético.

Puede hacer más lenta la respiración y el ritmo cardíaco, y provocar una sobredosis rápidamente. Puede estar mezclado con otras drogas.

Salvando Vidas
OREGON

SalvandoVidasOregon.org

02/09/26

Siempre tenga naloxona a la mano

La naloxona puede revertir los efectos del fentanilo, que es un opioide sintético.

Use menos y poco a poco

Las sobredosis pueden ocurrir de repente. Espacie sus dosis.

Considere opciones en vez de inyectarse

Inhalar o fumar tiene menor riesgo de sobredosis que el inyectarse.

Use drogas en turnos

Asegúrese que la otra persona esté alerta y tenga naloxona a la mano.

Analice sus drogas cada vez

Siempre analice sus drogas aún si las compra de la misma persona o bolsa.

Pida ayuda si usa drogas solo

Llame a un amigo o use un servicio como **SafeSpot Hotline** al 1-800-972-0590.

Escanee para agregar SafeSpot a su lista de contactos.



Qué debe saber sobre las tiras reactivas

Las tiras reactivas para detectar fentanilo son útiles, pero NO son perfectas.

- Los resultados no son siempre exactos. Pueden dar falsos positivos o falsos negativos.
- Las tiras reactivas de fentanilo solo detectan fentanilo. No detectan otras drogas. Su suministro puede contener otras sustancias.

- Las tiras reactivas no indican la cantidad ni la potencia.
- Un resultado negativo no significa que su suministro sea seguro.
- Que una porción del suministro haya salido negativa no significa que el resto de sus drogas estén libres de fentanilo.